

ОСМОТР СОБАКИ

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Как только вы заметили, что с собакой что-то не так, оцените ее состояние, следуя приведенным рекомендациям.

- Если это безопасно, подойдите к животному достаточно близко, чтобы можно было провести первичный осмотр, не потревожив его.
- Осмотрите собаку на предмет заметных ран, хромоты, деформаций тела; проверьте, нет ли дезориентации, дрожи или подергиваний.
- Отмечайте любые отклонения от нормы. Попытайтесь вспомнить, что могло послужить их причиной.
- Если вы обнаружили рану на голове или в области позвоночника, или если собаку тошнит, она дезориентирована или дрожит, немедленно звоните в ближайшую ветеринарную клинику и действуйте, как в случае экстренной ситуации.

ПРОВЕРКА ЖИЗНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОБАКИ

Следующим шагом после первичной оценки ситуации должна стать проверка жизненно важных показателей вашей собаки. К ним относятся температура тела, частота дыхания и пульс. Рекомендуем попрактиковаться в их измерении дома, когда питомец расслаблен, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.



ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ



Нормальный диапазон: от 10 до 35 вдохов в минуту

Самый простой способ измерить частоту дыхания собаки — считать вдохи, расположившись перед животным.

1 Когда собака сидит, следите за ее грудной клеткой.

Обратите внимание на то, как ваш питомец дышит в нормальном состоянии, чтобы в будущем вы могли заметить любые отклонения.

2 Подсчитайте, сколько вдохов собака делает за 15 секунд.



**Взрослая собака
10–35 вдохов в минуту**

3 Умножьте это число на 4, чтобы получить частоту дыхания в минуту.




**Щенок
15–40 вдохов в минуту**

4 Если частота дыхания намного больше или меньше значений нормального диапазона, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.



5 Если частота дыхания находится в пределах нормального диапазона, обратите внимание на качество дыхания — насколько оно отличается от обычного.

6 Если животное делает неритмичные, быстрые, затрудненные или неглубокие вдохи, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.



ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СОБАКИ

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА

Нормальный диапазон:

от 60 до 140 ударов в минуту

Нормальные значения частоты сердцебиения собаки зависят от ее размера. Небольшие собаки, как правило, имеют более частый пульс, от 100 до 140 ударов в минуту, в то время как у крупных животных пульс реже, примерно от 60 до 100 ударов в минуту.




1 Поместите левую руку на грудь собаки в область сердца, рядом с левой подмышкой.

2 Ощупывайте грудную клетку, пока не ощутите сердцебиение.

3 С помощью телефона или часов сосчитайте количество ударов в течение 15 секунд.

4 Умножьте это число на 4, чтобы получить число ударов в минуту.

5 Если получившийся результат значительно отклоняется от нормального диапазона в ту или иную сторону, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.



ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нормальный диапазон: от 38 до 39 °C

В зависимости от ситуации и в качестве крайней меры вам может понадобиться измерить температуру собаки. Для этого вполне подходит ректальный термометр, продаваемый в аптеке для людей. Для маленьких собак лучше купить детский термометр.

Чтобы получить точные показания, действуйте следующим образом.

1 Смажьте кончик термометра вазелином.

2 Попросите помощника удерживать собаку в положении стоя. Небольших собак часто удобнее размещать на столе.

3 Приподнимите хвост собаки и осторожно введите термометр в анус не глубже 2,5 см для некрупной собаки и 3,5 см для большой.


4 Страйтесь, чтобы собака стояла неподвижно, пока термометр не просигнализирует об окончании измерения.

5 Если температура выше 39,5 °C, считайте ситуацию критической и немедленно обращайтесь в ветеринарную клинику.

6 После окончания процедуры протрите кончик термометра спиртовой салфеткой.


КРУПНАЯ СОБАКА

Ведите кончик термометра не глубже 3,5 см




НЕБОЛЬШАЯ СОБАКА

Ведите кончик термометра не глубже 2,5 см



ДЕСНЫ

Рекомендуем регулярно осматривать десны вашей собаки. Наличие проблем можно определить по цвету десен (в норме они должны быть нежно-розового оттенка); кроме того, они не должны выглядеть сухими. Если после осторожного нажатия пальцем на десну ее цвет восстанавливается дольше двух секунд, это может быть признаком какого-либо нарушения.



БЛЕДНЫЙ ОТТЕНОК ДЕСЕН

Бледные, темные десны или их цвет, отличающийся от розового, — повод обратиться к ветеринару



Десны собаки отлично снабжаются кровью, поэтому в норме имеют нежно-розовый цвет, как у детской жвачки

ЦВЕТ ДЕСЕН

Синий

Синие десны являются признаком болезней, которые препятствуют нормальному дыханию и насыщению крови кислородом. К сожалению, эти заболевания чаще всего не поддаются лечению.

Бледный или белый

Обычно является признаком острой кровопотери или заболевания, вызывающего анемию. Собаку следует немедленно показать ветеринару.

Ярко-красный

Красные десны могут наблюдаться у собак с повышенной температурой тела. Стоматит или гингивит также вызывают покраснение десен (как предотвратить стоматологические проблемы, смотрите на с. 20).

Кровоточивость десен

Плохое состояние зубов может вызывать кровоточивость десен. Гигиена полости рта и регулярная чистка зубов помогут это предотвратить.

Ниже: если вы подозреваете, что собака нездорова, осмотрите ее пасть — цвет десен может многое сказать о состоянии животного.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСМОТРЕ

Если жизненные показатели собаки находятся в пределах нормы, но, несмотря на это, вам кажется, что она ранена или больна, внимательно осмотрите все ее тело. Если вы дали утвердительный ответ хотя бы на один из приведенных ниже вопросов, возможно, вашему питомцу требуется первая помощь.

ВАЖНО

Если какие-либо жизненно важные показатели собаки не соответствуют норме, немедленно обратитесь к ветеринару.

НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА ПРИКОСНОВЕНИЕ



Осторожно ощупайте тело собаки. Нет ли у нее негативной реакции, когда вы прикасаетесь к какой-либо части ее тела?

Нормально ли собака ходит, нет ли у нее хромоты или каких-то других проблем с походкой?

Справа: собака может быть нездорова, но при этом у нее не будет никаких отклонений жизненно важных показателей. Ответьте на дополнительные вопросы, чтобы определить, нуждается ли животное в осмотре специалиста.

ОСМОТРИТЕ КОЖУ ПОД ШЕРСТЬЮ



Нет ли у собаки судорог, рвоты или проблем с мочеиспусканием?

Тщательно осмотрите кожный покров под шерстью собаки. Нет ли у животного каких-либо видимых повреждений, шишек или кровотечения?

Осмотрите глаза собаки. Ее зрачки расширены? Белки глаз красного цвета?

Осмотрите десны собаки. Они синего или бледного цвета?



КОГДА НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ К ВЕТЕРИНАРУ

Ваша собака получила травму, но вы не можете точно определить, насколько она серьезна. Как понять, что пора вызывать ветеринара? При травме в любом случае стоит проявить повышенную осторожность.

Без профессионального обследования очень трудно сказать, насколько серьезен нанесенный здоровью ущерб. Может случиться так, что, когда вы приведете своего питомца в ветеринарную клинику, врач сразу подтвердит, что с собакой все в порядке. Если в этом будут сомнения, то в клинике имеются специалисты и необходимое оборудование для обследования и своевременного лечения. Большинство ветеринарных

клиник предпочитают, чтобы клиенты сначала звонили, — так персонал сможет узнать о случившемся, дать необходимые советы, а если ситуация чрезвычайная, нужные специалисты будут готовы к вашему появлению.

Ниже: если ваша собака нездорова или ранена, но вы не уверены, насколько серьезна ситуация, самое правильное решение — обратиться в ветеринарную клинику.



[Почтати описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВЕТЕРИНАРА

В случае появления у собаки каких-либо тревожных признаков необходимо срочно обратиться к ветеринару. Если ваша обычная клиника закрыта, обратитесь в ближайшую, которая работает круглосуточно.

Немедленно обратитесь к врачу, если собака пострадала от чего-либо из нижеперечисленного:


- травма (даже если внешне с собакой все хорошо);
- затрудненное дыхание;
- ожоги;
- возможное отравление;
- удар по голове;
- падение с высоты;
- проглатывание постороннего предмета;
- судороги (если они не вызваны диагностированным ранее заболеванием);
- удар электрическим током;
- утопление.



Выше: если собаку вырвало несколько раз в один день или однократно, но ежедневно на протяжении нескольких дней подряд, следует обратиться в ветеринарную клинику.

Немедленно обращайтесь в ветеринарную клинику, если у собаки отмечается что-либо из нижеперечисленного:

- сильный жар;
- высокий пульс;
- учащенное дыхание;
- длительная рвота и/или диарея;
- хромота;
- бессознательное состояние, обморок;
- дезориентация;
- патологическая окраска или бледность десен;
- множественные или длительные судороги;
- коллапс*;
- сильная боль;
- обильное кровотечение;
- паралич;
- затруднение мочеиспускания;
- потеря аппетита / отказ от воды;
- длительный кашель.



Выше: если ваша собака тонула (находилась под водой в течение какого-либо периода времени), обратитесь в ветеринарную клинику. Утопление может вызывать нарушения, которые сложно выявить дома самостоятельно.

В случае каких-либо сомнений, а также если слабые проявления сохраняются дольше 48 часов, лучше всего обратиться в ветеринарную клинику, чтобы специалисты могли проверить здоровье вашей собаки.

* Острая сосудистая недос-


[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

СИТУАЦИИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ЭКСТРЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ К ВЕТЕРИНАРУ

Если собака получила небольшую травму и вы оказали ей медицинскую помощь, используя методы, описанные в этой книге, лучше все равно обратиться в ветеринарную клинику для обследования питомца.

Ниже: внимательно следите за состоянием вашего питомца и обязательно обращайте внимание на любые изменения в его поведении. Будьте готовы отвезти животное в ветеринарную клинику, если его самочувствие ухудшится.

Если собака демонстрирует необычное поведение, возможно, причина этого кроется глубже



Выше: собаке с небольшой раной вы, скорее всего, сможете оказать первую помощь в домашних условиях, следуя инструкциям в этой книге, прежде чем отвезете питомца в ветеринарную клинику для более тщательного обследования.

Рекомендуем обращаться с питомцем в ветеринарную клинику, если у него имеются какие-либо подозрительные признаки или появились изменения в образе жизни или манере ходить



СИТУАЦИИ, С КОТОРЫМИ МОЖНО СПРАВИТЬСЯ ДОМА

Вот список некоторых проблем, с которыми вы можете справиться самостоятельно в домашних условиях:

- небольшие порезы;
- укусы пчел;
- однократная рвота;
- кратковременная диарея.

Даже в этих случаях рекомендуем вам позвонить в свою ветеринарную клинику и уточнить порядок действий.

Другой вариант – использовать какое-либо из современных приложений для смартфонов, с помощью которых вы можете задать вопрос ветеринарному врачу или попросить о видеоконсультации. Врачи, оказывающие такие услуги, обычно не ставят диагноз дистанционно, но могут посоветовать, нужно ли вам обращаться в клинику за неотложной помощью.

Ниже: всегда лучше обращаться в проверенную ветеринарную клинику, а не искать ответы на вопросы в интернете, где встречается множество ненадежных источников.

ВАЖНО

Не полагайтесь на интернет, когда ищете достоверную информацию о первой помощи вашей собаке. Ресурсы, которые вы найдете с помощью поисковой системы, дают очень много неверных и противоречивых сведений. Достоверную информацию можно найти на веб-сайтах ветеринарных клиник или организаций по защите животных. За экстренной и первой помощью всегда обращайтесь к ветеринару.



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ЧТО ДОЛЖНО ЛЕЖАТЬ В СОБАЧЬЕЙ АПТЕЧКЕ?

Конечно, предугадать, когда может произойти несчастный случай, невозможно, но наличие необходимых медикаментов и инструментов в аптечке первой помощи поможет эффективно действовать в непредвиденной ситуации и сделать все возможное для пострадавшей собаки, до того как везти ее в ветеринарную клинику.

Проверьте по списку ниже, что в вашей домашней аптечке есть все необходимое. В интернете или в зоомагазинах можно приобрести готовые наборы первой помощи для собак. Если у вас имеется такой готовый набор, вы также можете свериться со списком, чтобы убедиться, что в наборе есть все необходимое, и узнать больше о входящих в него предметах и их использовании в ситуации, когда необходимо оказать первую помощь.

Большинство предметов из списка можно легко найти в местной аптеке. Поскольку многие медицинские товары поставляются в больших упаковках, часть предметов можно взять из аптечки первой помощи для людей.

Ниже: заранее ознакомьтесь с тем, что входит в аптечку первой помощи для собак, и убедитесь, что в ней есть все, что может понадобиться в чрезвычайной ситуации. Убедитесь, что все упаковки целы и не повреждены, а когда используете что-нибудь из аптечки, не забудьте заменить использованные предметы.



[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Одноразовые резиновые или латексные перчатки

Помогают сохранять руки в чистоте и защищают от инфекции при оказании помощи раненой собаке. Если у вашего питомца агрессивный характер, возможно, стоит добавить в комплект плотные садовые перчатки для защиты рук.

Ножницы

Потребуются, чтобы разрезать пластырь, бинты или состричь собачью шерсть, если это необходимо. Купите ножницы с тупыми изогнутыми кончиками, чтобы не травмировать еще больше обеспокоенное животное.

Пинцет

Пинцетом удобно удалять занозы. Заранее подберите пинцет с плоскими кончиками, чтобы не травмировать собаку, и с более острыми кончиками — для удаления предметов из пасти.

Крючок-твистер

Используйте подобный крючок для удаления клещей (подробнее на с. 51). Специальные крючки намного безопаснее и эффективнее при удалении паразитов, чем пинцет.

Цифровой ректальный термометр

Использование цифровых термометров, предназначенных для собак или людей, — наиболее эффективный способ точно измерить температуру тела.

Полотенца

Могут пригодиться в качестве подстилки, для обработки раны, при транспортировке животного. Полотенцами можно укрыть собаку, которую нужно быстро согреть, а также их можно использовать для последующей уборки.

Вазелин

Необходим для смазывания кончика ректального термометра при измерении температуры тела собаки.



Ниже: большинство предметов в наборе первой помощи для собак можно купить в обычной аптеке для людей. Некоторые специальные принадлежности, например крючок для удаления клещей, проще найти в ветеринарной клинике.



[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)



ОЧИЩЕНИЕ РАН

Соль

Необходима для приготовления физиологического (солевого) раствора* — лучшего средства для промывания ран перед перевязкой в домашних условиях.

Ватные тампоны и шарики

Нужны для обработки ран физиологическим раствором; впитывают кровь.

Пипетка или пластиковый шприц без иглы

Ими удобно промывать рану физиологическим раствором, а также, в случае необходимости, влиять животному в пасть лекарство или воду.

Антисептические салфетки

Если вы не используете перчатки, необходимо обязательно продезинфицировать руки салфетками, прежде чем прикасаться к ране. Не обрабатывайте ими поврежденные участки кожи собаки, так как антисептик будет щипать, что еще больше растревожит ее.

Слева и ниже: принадлежности для промывания и очищения ран должны обязательно быть в аптечке. Даже если у вас всегда есть в запасе соль на кухне, рекомендуем держать немного и в аптечке, чтобы все, что может понадобиться, находилось в одном месте.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

* Продается в аптеках. Прим. науч. ред.

ПЕРЕВЯЗКА РАН

Марля

Марлю можно использовать как в виде тампонов, так и в виде бинтов, чтобы обернуть травмированное место или наложить давящую повязку. При наложении повязок на конечности следует соблюдать осторожность и не затягивать бинты слишком туго, так как они могут нарушать кровообращение и натирать кожу.

Неприлипающие бинты

Ими удобно пользоваться, когда нужно защитить рану от попадания грязи и уменьшить кровотечение. Накладывать клейкие бинты или пластиры непосредственно на рану нельзя. Повязку на лапе можно зафиксировать, надев на нее детский носок. Вам понадобится небольшой кусочек неприлипающего бинта, чтобы закрепить на лапе верхнюю часть носка; это также уменьшит риск наложить повязку слишком туго.

Лейкопластырь

Удобен для фиксации бинтов и марли.

ПРОЧИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Раствор для промывания глаз

Применяется в случае травмы глаза.

Список важных телефонных номеров

Номера ветеринара (в том числе и тот, по которому с врачом можно связаться в нерабочие часы) и ближайшей круглосуточной клиники неотложной помощи


Медицинская карта вашей собаки

Информация о лекарствах, которые принимает собака, а также полная история вакцинации. Ветеринару будет удобно иметь нужные сведения под рукой, особенно если вам придется обратиться не в свою обычную клинику.

Справа: поместите в аптечку первой помощи неприлипающие бинты и марлю — клейкие бинты и пластиры не подходят для собак.

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С СОБАКОЙ

Собачий намордник (подробнее на с. 77) или его самодельный вариант, например из мягкой ткани, маленького полотенца или капрового чулка (подробнее на с. 76), не даст собаке укусить вас. Не надевайте намордник на собаку, у которой наблюдается рвота.



- **ДЛИНА МОРДЫ:** от кончика носа, не доходя 2,5 см до линии глаз
- **ОКРУЖНОСТЬ МОРДЫ:** измеряется с помощью ленты, приложенной на 2,5 см ниже линии глаз, при ЗАКРЫТОЙ пасти животного. Прибавить 0,5 см для мелких пород и 1,5 см для средних и крупных пород
- **ВЫСОТА МОРДЫ:** от верхней части морды (нужно спуститься на 2,5 см от линии глаз) до линии челюсти, когда пасть собаки приоткрыта (как при тяжелом дыхании)
- **ШИРИНА МОРДЫ:** измеряется в самой широкой части морды
- **ЛИНИЯ ГЛАЗ:** от точки на 2,5 см ниже глаз до точки за ушами
- **ШЕЯ:** измеряется обхват шеи по точке пересечения с линией глаз



[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)



[Почитать описание, рецензии](#)
[и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)

[издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

Максимально полезные книги